

# Le cancer du pancréas et des voies biliaires

## Signes d'appel

Pour éviter un retard diagnostique préjudiciable dans ces cancers, il est important d'être **attentif aux signes d'appel** suivants. En cas de suspicion, c'est le **scanner abdomino-pelvien multiphasique\* avec injection** qui doit être demandé en première intention.

\* complété par un scanner thoracique pour le bilan d'extension potentiel

### ICTÈRE

accompagné ou non de prurit

**Cholestase biologique**, en règle générale sans fièvre



### AMAIGRISSEMENT

Perte de poids **rapide** (>10% dans les 3 derniers mois)

### DOULEURS ÉPIGASTRIQUES

Hypocondre gauche (+/-) avec **irradiations transfixiantes, aggravées par les repas** et ne répondant pas **aux inhibiteurs de la pompe à proton**



### DIABÈTE\*\*

**Découverte inattendue** ou **décompensation inexplicable** d'un diabète connu

- \*\* Recommandation de l'**Institut National du Cancer** : dépister un cancer du pancréas chez un diabétique en cas :
- 1) d'apparition récente du diabète (< 12 mois) chez un patient âgé de plus de 50 ans sans antécédent familial de diabète, ni surpoids.
  - 2) d'apparition récente du diabète (< 12 mois) chez un patient ayant une perte de poids > 10 % du poids du corps»

### AUTRES SIGNES



**Asthénie**  
Fatigue **anormale**

**Perte d'appétit**

