




Les cancers du pancréas et des voies biliaires



Signes d'appel



Pour éviter un retard diagnostique préjudiciable dans ces cancers, il est important d'être **attentif aux signes d'appel** suivants. En cas de suspicion, c'est le **scanner abdomino-pelvien multiphasique* avec injection** qui doit être demandé en première intention.

* complété par un scanner thoracique pour le bilan d'extension potentiel



ICTÈRE



accompagné ou non de prurit

Cholestase biologique, en règle générale sans fièvre



DOULEUR



Hypocondre droit (+/-) avec **irradiations transfixiantes, aggravées par les repas** et ne répondant pas **aux inhibiteurs de la pompe à proton**



PERTE DE POIDS



Amaigrissement **rapide** (>10% dans les 3 derniers mois)



DIABÈTE**



Découverte inattendue ou **décompensation inexpliquée** d'un diabète connu

** Recommandation de l'**Institut National du Cancer** : dépister un cancer du pancréas chez un diabétique en cas :
1) d'apparition récente du diabète (< 12 mois) chez un patient âgé de plus de 50 ans sans antécédent familial de diabète, ni surpoids.
2) d'apparition récente du diabète (< 12 mois) chez un patient ayant une perte de poids > 10 % du poids du corps»

AUTRES SIGNES



Asthénie
Fatigue **anormale**



Perte **d'appétit**

CDR Voies Biliaires - Pancréas

Tél : 06.01.90.74.76

Email : vbpancreas.hmn@aphp.fr

Direct
AP-HP



AP-HP.
Hôpitaux universitaires
Henri-Mondor



CPTSUBM
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
Unité des Bouttes de Marne

CENTRE
COORDINATION
CANCÉROLOGIE

ASSISTANCE
PUBLIQUE



HÔPITAUX
DE PARIS